

Syringa villosa

(Nom français : Lilas duveteux ou lilas tardif)

Caractéristiques de l'arbre

Type	Feuillu
Famille botanique	Oléacées
Zone de rusticité	2b
Forme	Arbuste
Exposition	Soleil, Mi-ombre
Croissance	Moyenne
Aspect de la plante	Port buissonnant, érigé, vigoureux ; couronne très dense ; branches très ramifiées

Taille à maturité

Hauteur : 3 m

Largeur : 2 m



Description des feuilles

Ovales et épaisses

Vert grisâtre, dessous glauque à l'été



Description des fleurs

Panicules érigées ; 8 à 20 cm de longueur

Couleur : rose lilas à blanchâtres ; boutons floraux roses

Saison : été, fin juin-juillet

Odeur : très parfumées, odeur semblable à celle du troène



Description des fruits

Capsules, sans intérêt

Utilisation animale : oiseaux

Sol

Type de sol Préfère les sols riches et mi-lourds

Humidité du sol Moyenne

Enracinement Superficiel ; plantation facile

Grande tolérance au compactage et au sel de déglacage

Maladies et insectes

Maladies : peu de problèmes pathologiques

Insectes : peu de problèmes entomologiques, kermès

Instructions de taille : une taille légère des fleurs fanées immédiatement après la floraison favorise la formation et la qualité de la plante en phase juvénile ; cette opération est seulement esthétique sur les vieux sujets.

Autres remarques : rustique, robuste, résistant à la pollution urbaine

